

בדיקה פיזיקאלית וממצאים לפנקריאטיטיס חריפה

מאת דנה שלמון
שנה א'
פנימית ב'

בדיקה פיזיקאלית

- מטרה: אבחון המחלה
- שאלות המכוונות לכאבים באזור הבטן:
- מיקום, אקוטי/כרוני, פתאומי או לא, משך זמן
- טיפול תרופתי
- היסטוריה משפחתית
- סימפטומים נוספים (רפלוקס, מחלות בכיס המרה..)

❖ **אקימוזיס (Ecchymoses)**

אקימוזיס

- שינוי בצבע העור כתוצאה מקרע בכלי דם.

- Cullen's Sign:

שינוי צבע עור לקבלת גוון כחלחל.

ממוקם מסביב לטבור.

כתוצאה משטף דם המגיע לאזור מהרטרופריטוניאום,
גסטרו-הפאטיק ליגאמנט, פלציפורם ליגאמנט.



Equimosis en la piel periumbilical característico de la pancreatitis hemorrágica


SIGNO DE CULLEN

■ :Grey Turner's Sign

שינוי צבע עור לקבלת גוון ירקרק.

ממוקם בדפנות הבטן

כתוצאה משטף דם לאזור מהחלל הפארה-רנאלי, קצה הקוואדראטוס לומבורום, טרנסוורסאליס פאסיה.





פנקריאטיטיס חריפה

- דלקת פתאומית בלב לב
- נגרם על ידי חסימה בצינור הלב לב (לדוגמא עקב אבן הנתקעת בשריר הסוגר).
- עצירת זרימת מיצי הלב לב תוביל לעיכול תאי הלב לב.
- 80% מהמקרים נובעים מאלכוהוליזם ומאבנים בכיס המרה
- בעזרת endoscopic retrograde cholangiopancreatography ניתן לראות את מבנה הצינור הסתום על ידי אבן בצינור המשותף עם כיס המרה.

