

Calcitonin

תיאור הבדיקה

קוד CPT

82308

שם הבדיקה

Calcitonin

שמות נוספים לבדיקה

קלציטונין

לאבחנה/טיפול

1. משמש באבחון ומעקב של סרטן מדולארי של בלוטת התריס ולהערכת התגובה לטיפול. 2. מסייע בהערכה של MENII וסרטן מדולארי משפחתי של בלוטת התריס.

שיטת ביצוע הבדיקה

Electro-chemi-luminescence-immunoassay (ECLIA)

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[אנדוקרינולוגיה](#)

מיקום המעבדה

בנין מטבוליזם אנדוקרינולוגיה וסוכרתקומה 4

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302801

המעבדה הקולטת את הדגימה

אנדוקרינולוגיה

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

--

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

לקביעת רמת בסיס רצוי לדגום לאחר צום של 12 שעות.

סוג הדגימה

דם

נפח דגימה

5 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

מבחנת ג'ל פקק צהוב

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

להעביר מידית למעבדה בקרח. אי עמידה בתנאי זה תביא לפסילת הדגימה. לרשום שעת
הלקיחה. גורמים מחוץ לבית החולים: יש להפריד את הדם תוך שעה מהלקיחה. את ההפרדה יש לבצע
בצנטריפוגה מקוררת ולהקפיא את הסרום מידית. חשוב כי הדגימות יגיעו קפואות למעבדה.

תנאי שינוע

להעביר מידית למעבדה בקרח. אי עמידה בתנאי זה תביא לפסילת הדגימה.

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

--

קריאת תוצאות

יחידת מידה

pg/ml

תחום ערכים תקינים

Males: 0-8.31 Female: 0-5.17

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

UK NEQAS for PTH, ACTH and hCT

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

ISO15189:2012

שם הגוף המסמך/מתעיד

הרשות הלאומית להסמכת המעבדות

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

עד 3 ימי עבודה, ובהתאם לדחיפות

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות