

anti-HEV IgG

תיאור הבדיקה

קוד CPT

804823

שם הבדיקה

anti-HEV IgG

שמות נוספים לבדיקה

נוגדן IgG HEV / נוגדן IgG להפטיטיס E

לאבחנה/טיפול

צהבת IgG HEV - בדיקת הימצאות נוגדני IgG נגד נגיף הפטיטיס E, המעידה על מחלה בעבר.

שיטת ביצוע הבדיקה

ELISA

מגבלות השיטה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[גסטרו](#)

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומה 1 מעל בנק הדם, חדר 258

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302905

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

מבוצע בשילוב עם IgM HEV-anti (לא ניתן לבצע כבדיקה בודדת)

המעבדה הקולטת את הדגימה

גסטרו

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

סוג הדגימה

דם

נפח דגימה

5 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

מבחנה כימית

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

יש לשלוח מיידית לאחר הלקיחה לטיל 124. גורמים מחוץ לבית החולים: יש להפריד את הסרום תוך 4 שעות ולהעביר לקרור בטמפ' 2-6. יש לשלוח עם קרח תוך 48 שעות.

תנאי שינוע

אחרי הפרדה, לשלוח תוך 48 שעות בקירור 2-6 מעלות למעבדה. או להקפיא 20- מעלות ולשלוח קפוא תוך שבועיים. אי עמידה בתנאי זה תביא לפסילת הדגימה.

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

לאחר סירכוז והפרדה ובטמפ' 20c- עד 6 חודשים.

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

RU/ml

תחום ערכים תקינים

חיובי / שלילי

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

Labquality

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

שם הגוף המסמיר/מתעיד

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

חודש

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות

הערות

הערות

מבוצע בשילוב עם IgG HEV-anti (לא ניתן לבצע כבדיקה בודדת)