

Anti Saccharomyces cerevisiae antibody (ASCA) IgG

תיאור הבדיקה

CPT קוד

87299

שם הבדיקה

Anti Saccharomyces cerevisiae antibody (ASCA) IgG

שמות נוספים לבדיקה

נוגדן מסוג IgG כנגד IgG ASCA (ASCA) cerevisiae Saccharomyces

לאבחנה/טיפול

לרמות בדיקות שתי מבוצעות במעבדה. Saccharomyces cerevisiae של נוגדנים לזיהוי בדיקה IBD
נוגדנים מסוג IgG ו-IgA, שיחד מהווים אמצעי עזר להבחנה בין קרוהן לקוליטיס כיבית. הנוגדנים נגד
קרוהן במחלת בלעדית כמעט מופיעים ASCA.

שיטת ביצוע הבדיקה

ELISA

מגבלות השיטה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[גסטרו](#)

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומה 1 מעל בנק הדם, חדר 258

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302905

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

מבוצע בשילוב עם בדיקת Anti Saccharomyces cerevisiae IgA (ASCA) (לא ניתן לבצע כבדיקה בודדת)

המעבדה הקולטת את הדגימה

גסטרו

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

סוג הדגימה

דם

נפח דגימה

5 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

מבחנה כימית

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

יש לשלוח מיידית לאחר הלקיחה לטיל 124. גורמים מחוץ לבית החולים: יש להפריד את הסרום תוך 4 שעות ולהעביר לקרור בטמפ' 2-6. יש לשלוח עם קרח תוך 24 שעות.

תנאי שינוע

אחרי הפרדה, לשלוח תוך 48 שעות בקירור 2-6 מעלות למעבדה. או להקפיא 20- מעלות ולשלוח קפוא תוך שבועיים. אי עמידה בתנאי זה תביא לפסילת הדגימה.

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

לאחר סירכוז והפרדת הסרום ובטמפ' 20c- עד 8 שבועות

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

U/ml

תחום ערכים תקינים

<18 חיובי, 12-18 גבולי,